



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684.
 Fax: 2510 600430
 E mail dpvrgiotou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 23/16-06-2022

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου.

ΑΜΠΕΛΙ



Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)

Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το δίκτυο φερομονικών παγίδων που διατηρεί η υπηρεσία μας, η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου συνεχίζεται. Οι συλλήψεις ανέρχονται σε έναν σχετικά χαμηλό αριθμό συλλήψεων παρέχοντας μία γενικότερα μη ομοιόμορφη εικόνα, που οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων και στην κλιματική αστάθεια η οποία επικράτησε επί σημαντικό χρονικό διάστημα. **Επισημαίνουμε όμως, ότι σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου, κατά την διάρκεια της δεύτερης γενιάς, διότι ελλοχεύει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών οι οποίες είναι σημαντικές, ιδίως στα επιτραπέζια σταφύλια.**

Σε συνέχεια των οδηγιών που παρείχαμε με το προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε η υπηρεσία μας, συνιστάται να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός εάν χρησιμοποιηθούν **ωοκτόνα – εντομοκτόνα**, κατά το χρονικό διάστημα 17-19 Ιουνίου στις πρώιμες περιοχές και 19-22 Ιουνίου στις οψιμότερες περιοχές. Στην περίπτωση εφαρμογής **προνουμφοκτόνων - εντομοκτόνων** οι ψεκασμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν τέσσερις έως έξι (4-6) ημέρες αργότερα, αντιστοίχως.

Τονίζεται και πάλι ότι οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή των ραγών, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης. Επιπροσθέτως θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως το ενδεδειγμένο ξεφύλλισμα των πρέμνων,

ανάλογα με το αμπέλι και την καλλιεργούμενη ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση και **ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα** επαφής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές προγνώσεις, ώστε όταν αναμένονται βροχοπτώσεις να μη πραγματοποιούνται ψεκασμοί καθώς τα εντομοκτόνα επαφής συχνά εκπλύνονται από την βροχή. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της πτήσης του εντόμου της ευδεμίδας θα σας ενημερώσουμε εφόσον απαιτηθεί.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους εχθρούς και ασθένειες (τζιτζικάκι – *Empoasca* spp, Ψευδόκοκκος - *Planococcus citri*, ωίδιο – *Erisiphe necator*, περονόσπορος - *Plasmopara viticola*, βοτρυτής – *Botrytis cinerea*), οι οποίοι μπορεί να προσβάλλουν το αμπέλι κατά την παρούσα περίοδο ισχύουν και πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες τις οποίες παραθέσαμε με το προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Σκόπιμο είναι για πρακτικούς λόγους αλλά και για λόγους κόστους να πραγματοποιούνται συνδυαστικοί ψεκασμοί, ελέγχοντας την συνδυαστικότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται.

Στο παραπάνω πλαίσιο, επισημαίνεται η αναγκαιότητα να αξιοποιούνται οι οδηγίες που παρέχονται κατά την συνταγογράφηση των σκευασμάτων.

Σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φ.π.) που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
- Είναι ανάγκη να τηρούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι οδηγίες που παρέχονται κατά την συνταγογράφηση.
- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpvrgiotou@minagric.gr thmarkopoulos@minagric.gr thgeorgiadou@minagric.gr.
- Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.
- Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου