



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684.
 Fax: 2510 600430
 E mail dpvrgiotou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 25 /24-06-2022

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου.

ΑΜΠΕΛΙ

Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)



Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το δίκτυο φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας και υπό τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες της παρατεταμένης ατμοσφαιρικής αστάθειας, η δεύτερη γενιά του εντόμου συνεχίζεται με μία σχετικά ανομοιόμορφη πτήση. Παρόλα αυτά επειδή η διάρκεια της πτήσης παρατείνεται και ο αριθμός των συλλήψεων κινείται σε επίπεδα που μπορούν να προκαλέσουν ικανή προσβολή και βλάβη στις ράγες στο παρόν βλαστικό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται το αμπέλι, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, εκ νέου, επαναληπτικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου σε συνέχεια των οδηγιών που παρείχαμε με τα

προηγούμενα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, τα οποία εξέδωσε η υπηρεσία μας. Έτσι συνιστάται να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός μία εβδομάδα μετά τον τελευταίο ψεκασμό ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε κάθε αμπελώνα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τονίζεται emphatically, μεταξύ των άλλων οδηγιών που παρασχέθηκαν το ενδεχόμενο αξιοποίησης και σκευασμάτων με βάση τον Βάκυλλο θουριγγίας (*Bacillus thuringiensis*), ο οποίος δεν αφήνει υπολείμματα δραστικών ουσιών στα παραγόμενα σταφύλια. Αυτονόητα οι ψεκασμοί πρέπει να επιτυγχάνουν καλή διαβροχή των ραγών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όποτε χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα επαφής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές προγνώσεις, ώστε όταν αναμένονται βροχοπτώσεις να μη πραγματοποιούνται ψεκασμοί καθώς τα εντομοκτόνα επαφής συχνά εκπλύνονται από την βροχή.

Όσον αφορά στα λοιπά εντομολογικά και φυτοπαθολογικά θέματα, σκόπιμη είναι η από κοινού καταπολέμηση του ωιδίου (*Erisiphe necator*), του εντόμου «τζιτζικάκι» (*Empoasca* spp), του ψευδόκοκκου (*Planococcus citri*), του περονόσπορου (*Plasmopara viticola*) και του βοτρυτή (*Botrytis cinerea*), τα οποία μπορεί να προσβάλλουν το αμπέλι κατά την παρούσα περίοδο και για τα οποία

ισχύουν και πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες τις οποίες παραθέσαμε με προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Επίσης επισημαίνεται η αναγκαιότητα να αξιοποιούνται οι οδηγίες που παρέχονται κατά την συνταγογράφηση των σκευασμάτων.

Υπενθυμίζεται η ανάγκη πραγματοποίησης ψεκασμού κατά του Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) σε μεταγενέστερο χρόνο λίγο πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού για την οποία η υπηρεσία μας θα επανέλθει με νέο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση, πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
- Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις εξειδικευμένες οδηγίες που παρέχονται με την συνταγογράφηση κατά την διάθεση των σκευασμάτων.



Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr, thmarkopoulos@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr,

Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

www.minagric.gr 



Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

κ.α.α

Δήμητρα Πυργιώτου