



Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και ΔΑΟΚ Σερρών

No 14/13-05-2025

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου, Δρ Δήμητρα Στουγιαννίδου.

1^ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Καρπόκαψα Μηλιάς (*Cydia pomonella*)



Το έντομο αποτελεί τον πιο διαδεδομένο καρποφάγο εχθρό των μηλοειδών. Διαχειμάζει ως αναπτυγμένη προνύμφη μέσα σε βομβύκιο, σε ρωγμές του φλοιού των δένδρων ή στο έδαφος.

Συμπληρώνει 3 – 4 γενεές το έτος. Σύμφωνα με τις συλλήψεις του δικτύου των φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, που αναρτήθηκαν στους Ν. Δράμας και Σερρών η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου. Τα αβγά

αποτίθενται πάνω στους καρπούς εντός των οποίων εισχωρούν οι νεαρές προνύμφες για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκκόλαψη. Το έντομο αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 10 - 34 °C. Οι πτήσεις των ενηλίκων ευνοούνται από θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 13 °C και η ωοτοκία από θερμοκρασίες 12 - 27 °C.

Ενδεικτικά αναφέρεται, ως κατάλληλος χρόνος ψεκασμού με προνυμφοκτόνα, στις 14-17 Μαΐου για την περιοχή. Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και στα ψηλά τμήματα των δένδρων. Το καρπίδιο είναι ευπαθές σε προσβολές όταν έχει διάμετρο περίπου δύο εκατοστών και αρχίζει να χάνει το χνούδι του.

Συνιστάται να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός σε 10-12 ημέρες.

Το δελτίο παρέχει μία τάση της πορείας των πληθυσμών η οποία μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο.

Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη, τις παρατηρήσεις τους, το ιστορικό του κάθε οπωρώνα (πολλές ή λίγες προσβολές τα προηγούμενα χρόνια) και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.




Καρπόκαψα Καρυδιάς (*Cydia pomonella*)

Από τα στοιχεία συλλήψεων της ΔΑΟΚ ΠΕ Σερρών η οποία έχει αναρτήσει παγίδες και σε καλλιέργειες με καρυδιές διαπιστώθηκε ότι έχει ξεκινήσει η πτήση του εντόμου. Στο βλαστικό στάδιο όμως στο οποίο βρίσκεται η καλλιέργεια (στάδιο άνθησης) δεν συνιστάται ψεκασμός γιατί δεν θεωρείται επιδεκτικό προσβολής από το έντομο.

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

+ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr

+ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr



+ Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου