



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου  
Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο  
Τηλ.: 2752026241  
Πληροφορίες: Γ. Μητσόπουλος

Αρ. Δελτίου 11 /10-5-23

**ΕΛΙΑ**

**1. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ**

**Οδηγίες:** Καταπολέμηση συνιστάται μόνο σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία (30-40% της κανονικής) και εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές προσβολές. Όπου κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση, να γίνει στο κρόκισμα ( στάδιο F).

**Φυτ/κά προϊόντα:** Στις βιολογικές καλλιέργειες ο ψεκασμός της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη κρίνεται αναγκαίος, σε κτήματα που παρουσιάζεται προσβολή, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου με σκευάσματα του Βάκιλλου δεν είναι αποτελεσματική.

**2. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ**

**Οδηγίες:** Να γίνει καταπολέμηση μόνο όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών (πάνω από 30% προσβεβλημένες ταξιανθίες).

**3. ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΒΛΑΣΤΩΝ**

Το θηλυκό ωοτοκεί σε ομάδες, σε τραύματα και κυρίως σε σχισμές του φλοιού κλαδίσκων, που προκαλούνται από διάφορα αίτια (ωοτοκίες Cicadidae, Jassidae, χαλαζόπτωση κλπ). Οι προνύμφες ζουν ομαδικά στο χώρο του κάμβιου. Σημαντικές ζημιές μπορεί να προκαλέσει σε φυτώρια και σε νεαρά δένδρα. Σε παραγωγικά δένδρα οι ζημιές δεν είναι αξιόλογες.

**Οδηγίες:** **Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων προτού οι προνύμφες πέσουν στο έδαφος. Αποφύγετε την δημιουργία πληγών στους βλαστούς (βοηθά έμμεσα στο να μην υπάρξουν προσβολές).**  
Σε νεαρά δένδρα, φυτώρια και νεαρά εμβόλια που υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση.

#### **4. ΑΚΑΡΕΑ**

Προσβάλλουν τους βλαστούς και τα φύλλα που εμφανίζουν παραμορφώσεις, και προκαλούν πτώση των ανθέων και των καρπών, αφού ο σχηματισμός των ταξιανθιών συμπίπτει με τη μέγιστη πληθυσμιακή τους πυκνότητα.

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν προσβολές σε αρκετούς ελαιώνες. Ο βαθμός προσβολής ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού και την περιοχή.

**Οδηγίες:** **Για την αντιμετώπιση τους, σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές (5-10 άτομα ανά ταξιανθία), να γίνει επέμβαση πριν την ανθοφορία (κλειστή ταξιανθία).**

#### **5. ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ (Φλοιοτρίβης- Φλοιοφάγος)**

**Οδηγίες:** **Καλλιεργητικά μέτρα:**  
Αφαίρεση των μισόξερων ή ξερών κλάδων και κλαδίσκων και απομάκρυνση τους από τον ελαιώνα.  
Τα ελαιόδενδρα να βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση με εφαρμογή λιπάνσεων και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων.  
**Σε ελαιώνες με έντονες προσβολές να γίνει επέμβαση αυτήν την εποχή**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α.**

**ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**