

## **A. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ**

### **1. ΜΟΝΙΛΙΑ**

**Διαπιστώσεις:** Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, είναι ευνοϊκές για την ασθένεια. Οι πρώιμες και όψιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευπαθή στις προσβολές.

**Οδηγίες:** Άμεση επέμβαση με τη λήψη του δελτίου στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες.

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Θειοφανεΐτ-μεθύλ, Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ, Συπροντινίλ, {χαλκούχο σκεύασμα μέχρι τη ροζ κορυφή}.*

### **2. ΚΟΡΥΝΕΟ**

**Οδηγίες:** Στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Θιράμ, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθιανόν.*

## **B. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ**

### **1. ΜΟΝΙΛΙΑ**

**Οδηγίες:** Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το ροζ μπουμπούκι και συνεχίζεται μέχρι την πτώση των πετάλων. Αυτό το χρονικό διάστημα τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Άμεση επέμβαση στις μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες.

**Φυτ/κά προϊόντα:** **1. Ροδακινιά:** *Ζιράμ, Θιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ, {χαλκούχο σκεύασμα μέχρι τη ροζ κορυφή}.* >

**2. Νεκταρινιά:** *Θειοφανεΐτ-μεθύλ, Κάπταν, Ιπροντιόν,*

*Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ.*

## **2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Σε υπερπρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς στην περιοχή Σκαφιδακίου Αργολίδας, υπάρχουν σοβαρές προσβολές από εξώασκο.

**Οδηγίες:** **Σας υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ'αυτή την περίοδο για να μην επαναληφθούν οι περσινές προσβολές.**

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

*Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.*

## **Γ. ΑΧΛΑΔΙΑ**

### **Βλαστικά στάδια**

**Γ**

**Γ3**

**Δ**

**Δ3**

**Ε**

## **1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ**

**Διαπιστώσεις:** Στις πεδινές περιοχές οι αχλαδιές βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια.

**Οδηγίες:** **Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις αχλαδιές των πεδινών περιοχών. Στις υπόλοιπες περιοχές η επέμβαση να γίνει στο ευαίσθητο στάδιο Γ3 - Δ με ένα εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.**

## **2. ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ**

Τα ακμαία θηλυκά ωοτοκούν επάνω στα άνθη της αχλαδιάς (στη βάση του κάλυκα). Οι νεαρές προνύμφες, που εκκολάπτονται σε λίγες μέρες, διεισδύουν στο εσωτερικό των μικρών καρπών απ' όπου και τρέφονται.

**Συμπτώματα:** Οι προσβεβλημένοι νεαροί καρποί παρουσιάζουν παραμορφώσεις, σκοτεινές κηλίδες και τελικά πέφτουν.

>

**Οδηγίες:** **Σε οπωρώνες που συνήθως υπάρχουν προσβολές, να γίνει προανθικός ψεκασμός, με επανάληψή του στην πτώση των πετάλων.**

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Φοσμέτ.*

### **3. ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΧΛΑΔΙΩΝ (Contarinia pyrivora)**

Τα ενήλικα θηλυκά ωτοκοούν μέσα στα κλειστά άνθη πριν ακόμη ανοίξουν (βλαστικό στάδιο Δ3-Ε). Οι νεαρές προνύμφες εκκολάπτονται σε λίγες μέρες και τρέφονται με το εσωτερικό της ωοθήκης.

**Συμπτώματα:** Τα προσβεβλημένα καρπίδια είναι μεγαλύτερα από τα απρόσβλητα, συχνά παραμορφωμένα και στη συνέχεια μαυρίζουν και πέφτουν.

**Οδηγίες:** **Σε οπωρώνες όπου κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, συνιστάται ένας ψεκασμός στο στάδιο Δ3-Ε (κλειστά διογκωμένα άνθη πριν ακόμη αυτά ανοίξουν) με εγκεκριμένο εντομοκτόνο.**

### **4. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ**

**Οδηγίες:** **Βλέπε δελτίο 7/21-2-11**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ