

A. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με τη λήψη του δελτίου στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά προϊόντα: *Θειοφανεΐτ-μεθύλ, Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ, Συπροντινίλ.*

2. ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες: Στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την μονίλια στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/κά προϊόντα: *Θιράμ, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθιανόν.*

B. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με τη λήψη του δελτίου στις μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά προϊόντα: **1. Ροδακινια:** *Ζιράμ, Θιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ*
2. Νεκταρινιά: *Θειοφανεΐτ-μεθύλ, Κάπταν, Ιπροντιόν, Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ.*

2. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών να γίνει επέμβαση ειδικά σε οπωρώνες που πέρσι είχαν προσβολές από εξώασκο. Σας υπενθυμίζουμε ότι, η περίοδος που μεσολαβεί από την

έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος, είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ'αυτή την περίοδο.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.

2.ΩΙΔΙΟ

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα βλαστούς και καρπούς στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Η ασθένεια είναι πιο συχνή σε πυκνούς οπωρώνες ευπαθών ποικιλιών και σε φυτώρια. **Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια.**

Οδηγίες:

Την κρίσιμη περίοδο τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Να γίνει η πρώτη επέμβαση στις αρχές του σταδίου του σχισίματος του κάλυκα και η επόμενη, μετά την πτώση του κάλυκα και πριν αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα. Σε ιδιαίτερα ευπαθείς ποικιλίες χρειάζονται επιπλέον επεμβάσεις, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος.

**Φυτοпр/κά
Προϊόντα:**

**{Θείον, Μπουπιριμέιτ Πενκοναζόλ, μόνο σε ροδακινιά},
Μυκλομπουτανίλ, Φενμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ .**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ