



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

31 / 8-7-11

ΑΧΛΑΔΙΑ (ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες -
Φυτ/κά
προϊόντα:**

**Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:**

1.Αμέσως με τη λήψη του δελτίου με: Φενοξυκάρμπ (30ημ),
Χλοραντранилиπρόλ (14ημ).

2.Μέχρι τις 13 Ιουλίου με:

Μεθοξυφenoζάιντ (14 ημ), Ντιφλουμπενζουρόν (30 ημ), Τεμπουφenoζάιντ (14 ημ), Φλουφenoζουρόν (56 ημ).

3.Από 14 ως 17 Ιουλίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων). Επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Δελταμεθρίν (7 ημ), Ιντοξακάρμπ (10 ημ), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ), Σπινোসάντ (14 ημ), Συπερμεθρίν (14 ημ), Συφλουθρίν (7 ημ), Φοσμέτ (28 ημ) Χλωρπυριφός (30 ημ), Χλωρπυριφός-μεθύλ (21 ημ),

Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες.

2. ΨΥΛΛΑ

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Τα αναφερόμενα στην καρπόκαψα που έχουν έγκριση και για την ψύλλα της αχλαδιάς, καθώς και {Αβαμεκτίνη - 10 ημέρες}, {Ιμιντακλοπρίντ, Λάμδα - Συαλοθρίν - 7 ημέρες}, {Ακριναθρίν, - 28 ημέρες}, Άλατα λιπαρών οξέων.



ΑΧΛΑΔΙΑ – ΜΗΛΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Στις ορεινές περιοχές η πρώτη πτήση συνεχίζεται με μέτριες συλλήψεις.

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου με:

**Φυτοпр/κά
προϊόντα:**

Μηλιά: Βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) Δελταμεθρίν, Θειακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Συφλουθρίν, Φοσμέτ.

Αχλαδιά: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) (3 ημ), Δελταμεθρίν (7 ημ), Ιντοξακάρμπ (10 ημ), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ), Σπινোসάντ (14 ημ), Συφλουθρίν (7 ημ), Φοσμέτ (28 ημ).

2. ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ (ΜΗΛΙΑ)

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**Φυτοпр/κά
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

3. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές να γίνει καταπολέμηση.

**Φυτοпр/κά
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

4. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (ΑΧΛΑΔΙΑ – ΜΗΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)

Οδηγίες: Να συνεχιστεί η προστασία σε οπωρώνες μηλιάς και αχλαδιάς που διαπιστώνετε ενεργές κηλίδες του μύκητα.

**Φυτοпр/κά
προϊόντα:**

Τα εγκεκριμένα σκευάσματα για μηλιά, αχλαδιά (βλέπε προηγούμενα δελτία).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1. Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία επέμβαση ως τη συγκομιδή. ΠΡΟΣΟΧΗ στην επιλογή του σκευάσματος.**
- Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ