



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου - Ν. Λογοθέτης

7 /6-3-12

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



Γ
Ροζ κορυφή



Δ
Λευκή κορυφή



Ε
Οι στήμονες
διακρίνονται



Ζ
Άνθη ανοιχτά



Η
Πτώση των πετάλων

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις:

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια.

Όλες οι ποικιλίες βερικοκιάς, βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα.

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση σε όλες τις ποικιλίες, με την λήψη του δελτίου. Σας υπενθυμίζουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα για την μονιλία.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θιράμ, Θειοφανεΐτ –μεθύλ (μία επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλостρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ, Συπροντινίλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2. ΚΟΡΥΝΕΟ

Συμπτώματα:

Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

Οδηγίες:

Να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/τικά προϊόντα:

Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.



Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια ξεκινάει από το ροζ μπουμπούκι και συνεχίζεται μέχρι την πτώση των πετάλων και συνεπώς, αυτό το χρονικό διάστημα τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα.

Φυτ/κά

προϊόντα:

1. Ροδακινιά: Ζιράμ, *Θειοφανεΐτ –μεθύλ (μία επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο)*, Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ, {Χαλκούχο σκεύασμα **-μόνο μέχρι το στάδιο Γ**}.

2. Νεκταρινιά: Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα **-μόνο μέχρι το στάδιο Γ**}.

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες:

Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την ασθένεια και οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδιο επιδεκτικό προσβολών. Να προστατευτούν άμεσα επειδή σε αρκετές περιοχές υπήρχαν πέρσι έντονες προσβολές και τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν κυρίως προληπτική δράση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν.

Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ - ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες:

Βλέπε δελτίο 6/13-2-12.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονιλία, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ