



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

27/20-06-12

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Η 2^η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις όψιμες περιοχές. Στις πρώιμες και μεσοπρώιμες, βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης είναι μέτριες ως χαμηλές.

Οδηγίες:

Στους αμπελώνες των όψιμων περιοχών και ιδιαίτερα σε οиноποιήσιμες ποικιλίες δεν απαιτείται επέμβαση επειδή οι συλλήψεις είναι περιοδικές και ελάχιστες ως μηδενικές.

Αν υπάρχει δεδομένο προσβολών από τα προηγούμενα χρόνια μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ .

Φυτ/κά

προϊόντα:

Β. Μέχρι τις 25 Ιουνίου με ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων:

Μεθοξυφenoζάντ, Χλωραντρανιλιπρόλ.

Γ. Από 26 μέχρι 30 Ιουνίου με:

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοάιτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμδα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Πυρεθρίνς, Σπινοςάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Στους αμπελώνες των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 26 ως 30 Ιουνίου με δραστικές ουσίες της ομάδας Γ..

2. ΩΙΔΙΟ

Διαπιστώσεις:

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.

Οδηγίες:

Να συνεχιστεί η προστασία. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια δράσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.



3. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οδηγίες:

Τα αμπέλια να ελέγχονται συστηματικά και επιμελημένα, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία και περιοχές που υπάρχει δεδομένο προσβολών.

Σε αμπελώνες που διαπιστώνονται προσβολές να χρησιμοποιείται σκεύασμα με θεραπευτική δράση.

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

**Φυτικά
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

Σημειώσεις:

1. Να χρησιμοποιούνται πάντα εγκεκριμένα σκευάσματα. Ένα σκεύασμα θεωρείται εγκεκριμένο όταν η καλλιέργεια στην οποία χρησιμοποιείται αναγράφεται στην ετικέτα του.
2. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.
3. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα.
4. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.
5. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛ. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ