



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

24 / 28-5-12

Α. ΑΜΠΕΛΙ

1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Οι χθεσινές καιρικές συνθήκες μπορεί να δημιουργήσουν μολύνσεις στους αμπελώνες όλων των περιοχών.

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου σε όλες τις περιοχές. Να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

2. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Οδηγίες:

Αναμένουμε την έναρξη της δεύτερης πτήσης του εντόμου. Να μην γίνει επέμβαση θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

Β. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1. ΚΟΡΥΝΕΟ- ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις:

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Υπάρχουν σποραδικές προσβολές από τους δύο μύκητες.

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

2. ΑΝΑΡΣΙΑ

Οδηγίες- Φυτ/κά

προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο .

Γ. ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου σε αχλαδιές και μηλιές όλων των περιοχών. Να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.



2. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Ορεινές περιοχές)

Διαπιστώσεις: Η πρώτη πτήση του εντόμου στις ορεινές περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη, με μέτριους πληθυσμούς.

**Οδηγίες-
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών να γίνει επαναληπτική επέμβαση από 1-4 Ιουνίου

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) - επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Δελταμεθρίν*, (*Εμαμεκτίν μπενζοϊτ-μόνο στη μηλιά*), *Θιακλοπρίντ*, *Ιντοξακάρμη*, *Μπέτα συφλουθρίν*, *Σπινοσάντ*, *Συφλουθρίν*, *T-Φλουβαλινέιτ*, *Φοσμέτ*, *Χλωρπυριφός*, *Χλωρπυριφός μεθύλ*.

Δ. ΚΕΡΑΣΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Συμπτώματα:

Ο μύκητας μπαίνει στον καρπό από σκασίματα που δημιουργούνται από διάφορες αιτίες (ακανόνιστα ποτίσματα έντονες βροχοπτώσεις κ.α.) και δημιουργεί σάπισμα στους καρπούς. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της σήψης.

Οδηγίες :

Να γίνει άμεσα επέμβαση με τη λήψη του δελτίου.

Τα ποτίσματα (όπου γίνονται), να σταματούν μερικές μέρες πριν την συγκομιδή.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

{*Θιράμ* -14 μέρες πριν τη συγκομιδή}, {*Θειοφανεϊτ-μεθύλ* μία μόνο επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο 14 μέρες πριν την συγκομιδή}, {*Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν*- 7 μέρες πριν τη συγκομιδή}, {*Μπιτερτανόλ* - 14 μέρες πριν τη συγκομιδή}, {*Ντιθιανόν* - 28 μέρες πριν τη συγκομιδή }.

2.ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ(Σκουλήκι των κερασιών)

Οδηγίες :

Στις πρώιμες ποικιλίες να μην γίνει επέμβαση. Στις όψιμες ποικιλίες, να γίνει ψεκασμός με την λήψη του δελτίου σε όλες τις περιοχές.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

{Βιολογικό εντομοκτόνο με βάση σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana* 0 ημέρες}, {*Δελταμεθρίν*- 7 μέρες πριν τη συγκομιδή }, {*Θιαμεθοξάμ*-7 μέρες πριν τη συγκομιδή}.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1. ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ**
- 2. Σε περιπτώσεις χαλαζόπτωσης καλό είναι να γίνεται άμεση επέμβαση -μέσα στο πρώτο 24ωρο- με ένα μυκητοκτόνο επειδή οι πληγές που δημιουργούνται είναι πύλες εισόδου διαφόρων παθογόνων.**
3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ