



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου - Ν. Λογοθέτης

6 / 13-02-12

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



Γ
Ροζ κορυφή



Δ
Λευκή κορυφή



Ε
Οι στήμονες
διακρίνονται



Ζ
Άνθη ανοιχτά



Η
Πτώση των πετάλων

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις:

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια.

Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα.

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση στις υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες, με την λήψη του δελτίου. Στις όψιμες ποικιλίες, η επέμβαση να γίνει όταν φτάσουν στο βλαστικό στάδιο Γ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα για την μονιλία.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Θιράμ, Θειοφανείτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ, Συπροντινίλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2. ΚΟΡΥΝΕΟ

Η ασθένεια προσβάλει όλα τα πυρηνόκαρπα. Στη βερικοκιά πιο σημαντική είναι η προσβολή των οφθαλμών, φύλλων και καρπών.

Συμπτώματα:

Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος. ►

Οδηγίες: Να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/τικά προϊόντα: *Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.*

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες: Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια ξεκινάει από το ροζ μπουμπούκι και συνεχίζεται μέχρι την πτώση των πετάλων και συνεπώς, αυτό το χρονικό διάστημα τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Άμεση επέμβαση στις υπερπρώιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά προϊόντα: **1. Ροδακινια:** *Ζιράμ, Θειοφανεΐτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.*
2. Νεκταρινιά: *Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Προπικοναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.*

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ'αυτή την περίοδο.

Φυτ/κά προϊόντα: *Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν.*

Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ **ΜΟΝΙΛΙΑ - ΚΟΡΥΝΕΟ**

Οδηγίες: **Σε κτήματα που δεν έγινε φθινοπωρινή επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα, συνιστάται ψεκασμός μέχρι το στάδιο Γ (χρήση εγκεκριμένου για την καλλιέργεια χαλκούχου σκευάσματος) για προστασία από τις παραπάνω ασθένειες.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονιλία, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ