



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

26/ 05-06-12

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Η 2^η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ .

προϊόντα: Β. Μέχρι τις 9 Ιουνίου με ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων:

Μεθοξυφenoζάντ, Χλωραντρανιλιπρόλ.

Γ. Από 10 μέχρι 14 Ιουνίου με:

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοϊτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμδα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Πυρεθρίνς, Σπινোসάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Για τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες: Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή, κυρίως κάτω από τα ρυτιδώματα. Σε αμπελώνες που πέρσι υπήρχαν προσβολές και δεν έγινε σωστή καταπολέμηση, θα υπάρχουν και φέτος.

Όπου διαπιστώνετε την ύπαρξη του εντόμου, να γίνει επιμελημένος ψεκασμός από 10 ως 14 Ιουνίου. Το ψεκαστικό υγρό να περνάει μέσα στα ρυτιδώματα. Όπου είναι εφικτό, ένα ξεφλούδισμα του κορμού βοηθά στην καλύτερη καταπολέμηση.

Φυτ/κά
προϊόντα:

Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός – μεθύλ



3. ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Να συνεχιστεί η προστασία. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια δράσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 20/4-5-12.

- Οι επεμβάσεις με κάθε δραστική ουσία ανά καλλιεργητική περίοδο, να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος.
- Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών στο πρόγραμμα των επεμβάσεων για να αποφευχθεί η δημιουργία ανθεκτικότητας.
- Οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης (*Μυκλομποτανίλ, Πενκοναζόλ, Σπιροξαμίν, Συπροκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Φενμπουκοναζόλ*), να μην εναλλάσσονται μεταξύ τους και οι επεμβάσεις με τα ανωτέρω να μην υπερβαίνουν τις (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Όπου είναι δυνατόν, να γίνει μια ελαφριά αποφύλλωση η οποία διευκολύνει τον αερισμό, την έκθεση στον ήλιο και τη διείσδυση του ψεκαστικού υγρού.
- Να γίνεται καλή κάλυψη όλων των ευαίσθητων οργάνων του αμπελιού. Οι εφαρμογές να γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες.

4. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οδηγίες:

Φυτ/κά

προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 24/28-5-12.

5. ΧΑΛΑΖΙ

Οδηγίες:

Μετά από χαλαζόπτωση και μέσα στο πρώτο 24ωρο, να επεμβαίνετε με χαλκούχο σκεύασμα. Προσοχή στις φυτοτοξικότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. **Να χρησιμοποιούνται πάντα εγκεκριμένα σκευάσματα. Ένα σκεύασμα θεωρείται εγκεκριμένο όταν η καλλιέργεια στην οποία χρησιμοποιείται αναγράφεται στην ετικέτα του.**
2. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.
3. Μην αναμινύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα.
4. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.
5. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ