



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: Α. Φωτοπούλου

40/3-8-18

### ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

#### 1.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

##### Διαπιστώσεις:

Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές έχουν ξεκινήσει οι εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών του εντόμου. Στις μανταρινιές κυρίως υπάρχουν σοβαρές προσβολές.

##### Οδηγίες:

**Σε οπωρώνες κυρίως μανταρινιάς των πρώιμων παραλιακών περιοχών που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση από 7 ως 11 Αυγούστου. Επειδή είναι η δεύτερη γενιά του εντόμου και συνυπάρχουν σχεδόν όλα τα βιολογικά στάδια του εντόμου απαιτείται επανάληψη της επέμβασης μετά από 10-12 ημέρες.**

##### Φυτ/κά

##### Προϊόντα:

*Θερινός πολτός, Αζαντιραχτίν- Α, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμέτ, Φενοξυκάρμπ.*

Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα άλλα εγκεκριμένα Φ.Π. Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

#### 2.ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)

##### Διαπιστώσεις:

Το έντομο βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα.

##### Οδηγίες:

**Α. Δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία:**

**Καλλιεργητικά μέτρα:**

α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.

β) αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών.

γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

**Χημικές επεμβάσεις δεν απαιτούνται.**

**Β. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμφόλια πρέπει να είναι προστατευμένα** με επεμβάσεις επαναλαμβανόμενες ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φ.π. που χρησιμοποιείται.

##### Φυτ/κά

##### προϊόντα:

**1.Πορτοκαλιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αζαντιραχτίν-Α, Αμπαμεκτίν, Ασεταμιπρίντ, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζαίντ, Μιλμπεμεκτίν, {Χλoραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία}.*

**2.Μανταρινιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αζαντιραχτίν-Α, Αμπαμεκτίν, Ασεταμιπρίντ, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζαίντ, Μιλμπεμεκτίν, Τεμπουφenoζαίντ, { Χλoραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία}.*

**3.Λεμονιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω: *Αζαντιραχτίν-Α, Αμπαμεκτίν, Ασεταμιπρίντ, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, { Χλoραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία}.*

#### **4.Φυτώρια πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς :Ασεταμιπρίντ**

Το *Θιαμεθοξάμ* μπορεί να εφαρμοστεί και με ριζοπότισμα σε νέα μη παραγωγικά δένδρα (1 γραμ ανά δένδρο).

### **3. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

**Διαπιστώσεις:** Υπάρχουν σποραδικές προσβολές.

**Οδηγίες:** Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση προκειμένου να επέλθει η ισορροπία από το ωφέλιμο το οποίο βρίσκεται σε δραστηριότητα. Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

### **4. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Διαπιστώσεις:** Οι πληθυσμοί είναι εξαιρετικά υψηλοί και ο κίνδυνος προσβολών πολύ μεγάλος.

**Οδηγίες:** Να συνεχιστεί η προστασία σε πορτοκάλια και μανταρινία που δεν έχουν συγκομισθεί.

**Φυτ/κά** Βλέπε δελτίο 21/10-5-18.

- προϊόντα:**
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**
1. Ο επαρκής αερισμός και ο φωτισμός του εσωτερικού της κόμης των δένδρων είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη όλων των κοκκοειδών.
  2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  3. Μπορείτε να προσκομίζετε δείγματα στην Υπηρεσία μας για έλεγχο.
  4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & Α.Α**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**