



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

31/27-6-18

### ΑΜΠΕΛΙ

#### 1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

##### Διαπιστώσεις- Οδηγίες:

Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος σε όλες τις περιοχές. Μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες να γίνει άμεσα επέμβαση με χρήση σκευάσματος με προληπτική και θεραπευτική δράση. Να εντατικοποιηθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι για το επόμενο δεκαήμερο.

##### Φυτ/κά προϊόντα:

Αζοξυστρομπίν, Αμετοκτραντίν+Μετιράμ, Αμετοκτραντίν+Ντιμεθομόρφ, Αμισουλμπρόμ+Φολπέτ(μόνο στα οиноποιήσιμα), Αμισουλμπρόμ, Ιπροβαλικάρμπ+ Προπινέμπ, Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ-μ, Μανκοζέμπ +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ, Μαντιπροπαμίντ+χαλκός, Μαντιπροπαμίντ+ Μανκοζέμπ, Μαντιπροπαμίντ+ Ζοξαμίντ, Μπεναναξύλ+Μανκοζέμπ, Μπεναναξύλ-μ+Μανκοζέμπ, Μπεναναξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ+Χαλκός, Μετιράμ, Μπενθιαβαλικάρμπ+Μανκοζέμπ, Μπενθιαβαλικάρμπ +Χαλκός, Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ, Ντιμεθομόρφ+Μανκοζέμπ, Ντιμεθομόρφ + Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ + Φολπέτ, Ντιθιανόν, Potassium phosphonates, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόν, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ+ Φοσετύλ-αλ, Συμοξανίλ+Ζοξαμίντ, Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ, Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Προπινέμπ, Φολπέτ, Φολπέτ+Τριαντιμενόν, Φολπέτ+Μεταλαξύλ+Χαλκός, Φολπέτ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ, Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+Ιπροβαλικάρμπ, Χαλκός+Ζοξαμίντ, Χαλκός+Ντιμεθομόρφ.

### 2. ΩΙΔΙΟ

#### Οδηγίες:

##### Φυτ/κά προϊόντα:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.

**Α. Με προληπτική ή κυρίως προληπτική δράση:** Αζοξυστρομπίν, Διττανθρακικό Κάλιο, Σκόνη θειαφιού ή βρέξιμο θειάφι, (βοηθά και στην αντιμετώπιση των ακάρεων), Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός, Λαμιναρίν, Μεπτυλντινοκάπ, Προκουιναζίντ.

**Β. Με προληπτική και θεραπευτική δράση:**

Αζοξυστρομπίν+Τεμπουκοναζόλ, Κυνοξифέν, Μυκλομπουτανίλ, Μυκλομπουτανίλ+Κυνοξифέν, Μετραφενόν, Μπουπιριμέιτ, Μπουπιριμέιτ+ Τεμπουκοναζόλ, Ντιφenoκoναζόλ, Ντιμεθομόρφ+ Πυρακλοστρομπίν, Πενκoναζόλ, Πενκoναζόλ+Κρεσόςιμ-μεθύλ, Προπινέμπ+ Τριαντιμενόν, Σπιροξαμίν, Συπροκoναζόλ, Συφλουφenaμίντ+Ντιφenoκoναζόλ, Τεμπουκoναζόλ, Τριαντιμενόν, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκoναζόλ, Φλουξαπυροξάντ, Φλουτριάφoλ (μόνο στα οиноποιήσιμα), ►

*Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Ampelomyces quisqualis (AQ 10).*

Οι επεμβάσεις με κάθε δραστική ουσία ανά καλλιεργητική περίοδο, να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος.

Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών στο πρόγραμμα των επεμβάσεων για να αποφευχθεί η δημιουργία ανθεκτικότητας.

### **3. ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

#### **Διαπιστώσεις-Οδηγίες:**

**Να συνδυαστεί η καταπολέμηση του βοτρυτή με τις προηγούμενες δυο επεμβάσεις.**

Η σωστή καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας και η χρησιμοποίηση καλλιεργητικών τεχνικών που μειώνουν την υγρασία, συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας.

#### **Φυτ/κά προϊόντα:**

*Aureobasidium pullulans strain 14940 & 14941 Bacillus subtilis strain, Eugenol+Geraniol+Thymol, potassium hydrogen carbonate, Θιράμ (μόνο σε οиноποιήσιμα), Ιπροντιόν, Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Πυριμεθανίλ, Συηπροντινίλ+ Φλουντιοξονίλ, Φενχεξαμίντ, Φενπυραζαμίν, Φλουαζινάμ.*

### **4.ΕΥΔΕΜΙΔΑ**

#### **Διαπιστώσεις-Οδηγίες:**

**Αναμένεται η έναρξη της επόμενης πτήσης. Θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.**

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**