



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: Α. Φωτοπούλου

39/ 2-8-18

### ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ (ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

#### 1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε η τρίτη πτήση του εντόμου στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες Φυτ/κά προϊόντα:** Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών που καθυστερεί η συγκομιδή μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

**1.Ως τις 3 Αυγούστου με:** Αμπαμεκτίν+Χλοραντранилиπρόλ (14 ημ.), Φενοξυκάρμπ (14 ημ.), Χλοραντранилиπρόλ (14 ημ.).

**2. Μέχρι 5 Αυγούστου με:**

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία), Αμπαμεκτίν+Ακριναθρίν (14 ημ.), Ασεταμιπρίντ (14 ημ.), Μεθοξυφenoζάντ (14 ημ.), Τεμπουφenoζάντ (14 ημ.).

**3.Από 6 ως 10 Αυγούστου με:**

Δελταμεθρίν (7 ημ.), Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Εμαμεκτίν μπενζοείτ (7 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινোসάντ (14 ημ.), Σπινετοράμ (7 ημ.), Τ-Φλουβαλινείτ (30 ημ.), Φοσμέτ (28 ημ.), Χλωπυριφός μεθύλ (21 ημ.).

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

**1.Ως τις 3 Αυγούστου με:** Φενοξυκάρμπ.

**2. Μέχρι 5 Αυγούστου με:**

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας.

**3.Από 6 ως 10 Αυγούστου με:**

Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Σπινετοράμ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωπυριφός μεθύλ, Χλωπυριφός.

Στις αχλαδιές κυδωνιές και μηλιές των ορεινών περιοχών να γίνει επέμβαση με την λήψη του δελτίου. Η έναρξη της τρίτης πτήσης καθυστερεί λόγω θερμοκρασιών.

#### 2. ΣΕΖΙΑ

**Οδηγίες:**

Σε οπωρώνες με προσβολές να γίνει καταπολέμηση μετά την συγκομιδή.

**Φυτ/κά προϊόντα:**

Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.).

### **3. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Οδηγίες:** **Απαιτείται μεγάλη προσοχή. Λόγω των υψηλών πληθυσμών του εντόμου ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος. Ο καρπός να είναι προστατευμένος ως την συγκομιδή.**

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Ασεταμιπρίντ(14 ημ.), Δελταμεθρίν (7 ημ. με ψεκασμό) ή παγίδες .*

### **4. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ**

**Οδηγίες:** **Στις καρυδιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:**

**1.Ως τις 3 Αυγούστου με:** *Φενοξυκάρμπ , Χλοραντраниλιπρόλ .*

**2. Μέχρι 5 Αυγούστου με:**

*Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας.*

**3.Από 6 ως 10 Αυγούστου με:**

*Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.*

**Στις καρυδιές των ορεινών περιοχών να γίνει επέμβαση με την λήψη του δελτίου.**

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &Α.Α**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**