



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

23 / 21-5-18

### ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

#### 1. ΠΟΥΛΒΙΝΑΡΙΑ (*Pulvinaria floccifera*)

**Διαπιστώσεις:** Οι εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών στις πρώιμες περιοχές είναι 70-80% και στις όψιμες 50-60%.

**Οδηγίες:**

Στους οπωρώνες των πρώιμων περιοχών που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση από 26 – 30 Μαΐου. Στις όψιμες περιοχές η επέμβαση να γίνει από 1-5 Ιουνίου. Να γίνει καλό λούσιμο των δένδρων και του εσωτερικού της κόμης τους. Οι προηγούμενες επεμβάσεις για τα άλλα κοκκοειδή, δεν είναι αποτελεσματικές για την Πουλβινάρια.

**Φυτ/κά  
Προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων.

#### 2. ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

**Διαπιστώσεις:**

**Οδηγίες:**

Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην Πουλβινάρια ανάλογα με την πρωιμότητα της περιοχής. Ιδιαίτερη προσοχή στις μανταρινιές επειδή φαίνεται ότι το έντομο τις προτιμά.

**Φυτ/κά  
Προϊόντα:**

Θερινός πολτός, Αζαντιραχτίν- Α, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμέτ, Φενοξυκάρμπ.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

#### 3. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόμου στις πρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες:**

**Α. Δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία:  
Καλλιεργητικά μέτρα:**

- α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- β) αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών.
- γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

**Χημικές επεμβάσεις δεν απαιτούνται.**



**Β. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να προστατευτούν** με επεμβάσεις επαναλαμβανόμενες ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**1.Πορτοκαλιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αζαντιραχτίν-Α, Αμπαμεκτίν, Ασεταμιπρίντ, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μιλμπεμεκτίν, {Χλοραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία}*.

**2.Μανταρινιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αζαντιραχτίν-Α, Αμπαμεκτίν, Ασεταμιπρίντ, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μιλμπεμεκτίν, Τεμπουφenoζάιντ, { Χλοραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία}*.

**3.Λεμονιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω: *Αζαντιραχτίν-Α, Αμπαμεκτίν, Ασεταμιπρίντ, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, { Χλοραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία}*.

**4.Φυτώρια πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς :***Ασεταμιπρίντ*  
Το *Θιαμεθοξάμ* μπορεί να εφαρμοστεί και με ριζοπότισμα σε νέα μη παραγωγικά δένδρα (1 γραμ ανά δένδρο).

**4. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

**Οδηγίες:**

**Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση.**

Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

**5. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Οδηγίες:**

**Να συνεχιστεί η προστασία στα όψιμα πορτοκάλια και μανταρινία που δεν έχουν συγκομισθεί.**

**Φυτ/κά**

**προϊόντα:**

Βλέπε δελτίο 21/10-5-18.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Ο επαρκής αερισμός και ο φωτισμός του εσωτερικού της κόμης των δένδρων είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη όλων των κοκκοειδών.
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Μπορείτε να προσκομίζετε δείγματα στην Υπηρεσία μας για έλεγχο.
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**