



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.624.576 (εσωτ.:80262)
Email: npettas@minagric.gr, pkpfpatr-gp@minagri.gr

Πληροφορίες:

Πέττας Νίκος, Γεωπόνος PhD, MBA, MSc

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας

ΑΜΠΕΛΙ

Ν° 3 / 2-6-2026

Για τις περιοχές:
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ

Βλαστικά Στάδια Αμπελιού



Η.

Σταφύλια
χωρίζουν

**Βλαστικά
στάδια:**



Θ.

Έναρξη
άνθησης



Ι.

Άνθηση




Κ.

Δέσιμο
ραγών



Λ.

Μέγεθος
μπίζελιου



Μ.

Πριν το
κλείσιμο

Πεδινές - πρώιμες περιοχές-πρώιμες ποικιλίες: Στάδιο Κ-Λ
Ορεινές - όψιμες περιοχές-όψιμες ποικιλίες: Στάδιο Θ - Ι

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:
**Έναρξη 2^{ης}
γενεάς**

Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές η 2η πτήση του εντόμου το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (28 Μαΐου). Το 50% των ωοτοκίων και η κορύφωση των εκκολάψεων αναμένεται άμεσα, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου (6 έως 10 Ιουνίου). Επίσης, εκτιμάται ότι η πτήση και η δραστηριότητα των προνυμφών της 2ης γενεάς θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου.

Συστάσεις:

- ✓ Ψεκασμός με Ωοκτόνα: Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση (π.χ. Paraffin oil, Azadirachtin), η 1η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα **4 – 5 Ιουνίου**. Συνιστάται η άμεση δειγματοληψία σε 100 ράγες για εντοπισμό ωοτοκίων
- ✓ Ψεκασμός με Προνυμφοκτόνα: Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα (*Bacillus thuringiensis* (Bt), Spinosad, Spinetoram, Chlorantraniliprole, Emamectin benzoate, Tebufenozide. (Μόνο για Οινοποιήσιμα αμπέλια: Cyantraniliprole)), η 1η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα **6 – 10 Ιουνίου**, όπου προβλέπεται μέγιστο εκκολάψεων).

Μεσοπρώιμες / Ορεινές περιοχές:

- ✓ Στις μεσοπρώιμες περιοχές, οι επεμβάσεις να μετατεθούν κατά 3 έως 5 ημέρες αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών θερμοκρασιών.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου προσβολής (δειγματοληψία 100 ραγών). Η απόφαση για τον χρόνο επανάληψης της επέμβασης εξαρτάται από τον επανέλεγχο του ύψους της προσβολής, την παραγωγική κατεύθυνση (επιτραπέζιο ή οινοποιήσιμο), την ευαισθησία της ποικιλίας, το ιστορικό του αμπελώνα και την

υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΑΚΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC

Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες από τη Δ/ση Προστασίας ΦΠ:

Η Βάση Δεδομένων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων είναι διαθέσιμη από τη Δ/ση Προστασίας ΦΠ:

Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Εξοπλισμό Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων:

Προγνωστικοί Χάρτες Χαμηλών Θερμοκρασιών / Παγετού είναι διαθέσιμοι από την ΕΜΥ:

Τα Δελτία είναι προσβάσιμα με κινητό (smartphone) στην εφαρμογή [i-agric-ypaat](https://i-agric-ypaat.minagric.gr):

Τα Δελτία αναρτώνται στον ηλεκτρονικό κόμβο του Υπουργείου www.minagric.gr



Δωρεάν παραλαβή των δελτίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με απλό αίτημα στα email της υπηρεσίας.