



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 334 ΠΑΤΡΑ ΤΚ 26443

ΤΗΛ.2610224629

Email : pkpfpatr@otenet.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΗΓΑΣ

ΑΜΠΕΛΟΣ 1/1-2-12

### ΙΣΚΑ

( Παθογόνο: *Stereum hirsutum*)

Η προσβολή αρχίζει από το ξύλο εσωτερικά της κληματίδας και επεκτείνεται αργά προς την περιφέρεια. Αντίθετα όμως στους βραχίονες η επέκταση πραγματοποιείται ταχύτατα και φτάνει ως το υπόγειο τμήμα του πρέμνου. Το προσβεβλημένο σημείο παρουσιάζεται κιτρινόλευκο με σπογγώδη και μαλακή υφή.

Προτείνεται η απολύμανση των τομών κατά το κλάδεμα και η επάλειψη με προστατευτικό τομών.

### ΦΟΜΟΨΗ

( Παθογόνο: *Phomopsis viticola*)

Η προσβολή παρουσιάζεται στις κληματίδες, τους βραχίονες και τα φύλλα των πρέμνων. Προσβάλλει την ειήσια βλάστηση και το παλιό ξύλο. Στα φύλλα εμφανίζονται νεκρωτικές κηλίδες και νεκρώσεις στους μίσχους. Η ασθένεια ευνοείται από βροχερό καιρό.

Συνιστάται αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων μερών του πρέμνου.

### ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ

( Παθογόνο: *Eutypa lata*)

Η προσβολή ξεκινάει από μη επουλωμένες τομές κλαδέματος, όπου μετά από βροχή ελευθερώνονται τα ασκοσπόρια από τα περιθήκια. Η επέκταση της ασθένειας γίνεται αργά και νωρίς την άνοιξη παρουσιάζεται η εικόνα καχεκτικής βλάστησης με χλωρώσεις, βραχυγονάτωση και στη συνέχεια ξήρανση κεφαλών και βραχιόνων.

Συνιστάται το κλάδεμα να πραγματοποιείται στο τέλος του χειμώνα με ξηρό καιρό και νηνεμία και ποτέ μετά από βροχόπτωση.

Επίσης πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεμα σε συνθήκες παγετού.

**ΣΗΜ:** Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Π. ΟΡΦΑΝΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ