

## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Πανεπιστημίου 334

ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610.224.629

Fax: 2610.623.238

Email: [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)

ΑΧΑΪΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΕΣΠ: 3/14-5-12

### ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

#### ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:

**Διαπιστώσεις:** Οι διαχειμάζουσες προνύμφες του εντόμου έχουν βγει από τα κατάφυγιά τους και κινούνται προς τα προφυλαγμένα και σκιαζόμενα μέρη του δέντρου όπως είναι ο κάλυκας των νεαρών καρπών και τα σημεία επαφής μεταξύ καρπών ή φύλλων και καρπών. Εκεί εγκαθίστανται και δημιουργούν αποικίες, από όπου επεκτείνονται οι προσβολές επάνω στα δένδρα, οι οποίες γίνονται αντιληπτές τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο όταν είναι ήδη αργά για καταπολέμηση του εντόμου.

Οι συλλήψεις του Ψευδόκοκκου στις παγίδες ξεκίνησαν το γ' 10ήμερο του Απριλίου και είναι πολύ αραιές.


**Συστάσεις:** Ψεκασμός στα δενδροκομεία που διαπιστώθηκαν πέρυσι σοβαρές προσβολές και κυρίως στις ομφαλοφόρες ποικιλίες.

**Ενδεικτικές ημερομηνίες:** Πρώιμες παραλιακές περιοχές: 19 - 22 Μαΐου.

Μεσοπρώιμες περιοχές: 23 - 26 Μαΐου.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πρέπει να γίνει προσεχτική παρατήρηση των δέντρων και οι επεμβάσεις να κλιμακωθούν ανάλογα με την περιοχή **οπωσδήποτε πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν επάνω στον καρπό** (βλέπε σχέδιο).



ΝΑΙ

ΟΧΙ

#### ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ - ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ:

**Διαπιστώσεις:** Οι συλλήψεις της Κόκκινης Ψώρας στις παγίδες ξεκίνησαν το β' 15ήμερο του Απριλίου και είναι πολύ χαμηλές.

Ορισμένες προσβολές από τη Μυτιλόμορφη Ψώρα διαπιστώνονται στα εσπεριδοειδή της Ηλείας.

Η Λευκή Ψώρα εμφανίζεται στις λίγες εναπομείνουσες λεμονιές (Αιγιάλεια).

**Συστάσεις:** Μόνο στα δενδροκομεία που παρουσίασαν πέρυσι σοβαρές προσβολές από τη μία ή τις τρεις ψώρες να γίνει καταπολέμησή τους σε συνδυασμό με τον Ψευδόκοκκο.

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ:**

Στα δένδροκομεία που γίνονται πολλές επεμβάσεις με εντομοκτόνα συχνά παρατηρούνται προσβολές από Κόκκινο Τετράνυχο.

Συστάσεις: **Παρακολούθηση των δένδρων και ψεκασμός στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται τουλάχιστον 2 – 3 κινητές μορφές ανά φύλλο.**

**ΑΦΙΔΕΣ:**

Συστάσεις: **Στα δένδροκομεία που διαπιστώνονται τα έντομα να γίνει καταπολέμηση.**

**ΘΡΙΠΕΣ:**

Διαπιστώσεις, Συμπτώματα: Σε ορισμένες περιοχές διαπιστώθηκαν προσβολές από το έντομο, το οποίο προκαλεί επιδερμικές αλλοιώσεις και παραμορφώσεις των καρπών. Η προσβολή αρχίζει όταν οι καρποί έχουν μέγεθος μπιζελιού έως και καρυδιού.

Συστάσεις: **Συνδυασμένη καταπολέμηση με Ψευδόκοκκο στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ζημιές την προηγούμενη χρονιά.**

**ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ - ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:**

Συστάσεις: Οι προσβολές στη νέα βλάστηση δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.  
**Δεν χρειάζεται προς το παρόν αντιμετώπιση.**

**ΛΕΜΟΝΙΑ****ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ:**

Διαπιστώσεις, Συστάσεις: **Να παρακολουθούνται τα δένδρα και εάν διαπιστωθούν περισσότερα από 5% άνθη ή καρποί προσβεβλημένοι, να γίνει επέμβαση.**

Φάρμακα: **Στις λίστες των φαρμάκων που έχουν αποσταλεί. Ο θερινός πολτός δεν καταστρέφει τα ωφέλιμα έντομα και ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται βιολογική καταπολέμηση.**

Συστάσεις: **ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον δεν διαπιστώνεται σοβαρή προσβολή από κάποιο εχθρό στα εσπεριδοειδή, να αποφεύγονται οι ψεκασμοί, για να προστατεύονται τα ωφέλιμα έντομα.**

**ΣΗΜ:** Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ  
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ