



No 11 / 4 Μαΐου 2011

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΛΙΝΕΣ – ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

α. Καρπόκαψα.

Να γίνει ψεκασμός :

- Αμέσως μόλις πάρετε το δελτίο και μέχρι **8 Μαΐου** με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ ή
- Από **9 - 11 Μαΐου** με ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ (σκεύασμα CORAGEN) ή
- Από την παραλαβή του δελτίου μέχρι **16 Μαΐου** με ρυθμιστές (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΛΟΥΦΕΝΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΤΕΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ) ή
- Από **17 - 19 Μαΐου** με κλασσικά εντομοκτόνα όπως ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, κ.α.


Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά 2- 3 βδομάδες, ανάλογα με το αγροχημικό.

- Οι ρυθμιστές να προτιμηθούν αν είχαμε ζημιές και από νάρκες.
- Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από **17 - 19 Μαΐου** ιολογικά εντομοκτόνα CrGV, τα οποία είναι ιδιαίτερα συμβατά με την ολοκληρωμένη διαχείριση (3 εφαρμογές ανά δεκαήμερο).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Σε κτήματα που δεν παρουσιάζουν σημαντικές προσβολές μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική προστασία με μία μόνο εφαρμογή με ρυθμιστές μέχρι 16 Μαΐου, ή με κλασσικά και ιολογικά 21 - 22 Μαΐου.
- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

β. Φουζικλάδι : Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά μυκητοκτόνα ή με μίγματα τους με θεραπευτικά (τριαζόλες- βενζιμιδαζόλες) ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές.



ΛΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Καρπόκαψα : Όπου εμφανίζονται κάθε χρόνο προσβολές και μόνο όπου για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένη καρπόδεση συνιστάται η προστασία του καρπιδίου μέχρι 13-14 Μαΐου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ ή 15 – 17 Μαΐου με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, κ.α.

- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός μετά από 2 εβδομάδες.
- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός για τη σκωρίαση όπως στο δελτίο μας Νο 4 / 2 Μαρτίου 2011.

ΟΡΕΙΝΕΣ – ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΔΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

α. Καρπόκαψα.


Να γίνει ψεκασμός :

- Αμέσως μόλις πάρετε το δελτίο και μέχρι 12 - 13 Μαΐου με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ ή
- Από 13 - 15 Μαΐου με ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ (σκεύασμα CORAGEN) ή
- Από την παραλαβή του δελτίου μέχρι 20 Μαΐου με ρυθμιστές (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΛΟΥΦΕΝΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΤΕΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ) ή
- Από 21 - 23 Μαΐου με κλασσικά εντομοκτόνα όπως ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, κ.α.

Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά 2- 3 βδομάδες, ανάλογα με το αγροχημικό.

- Οι ρυθμιστές να προτιμηθούν αν είχαμε ζημιές και από νάρκες.
- Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 21 - 23 Μαΐου ιολογικά εντομοκτόνα CrpGV, τα οποία είναι ιδιαίτερα συμβατά με την ολοκληρωμένη διαχείριση (3 εφαρμογές ανά δεκαήμερο).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J).
- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
 - Σε κτήματα που δεν παρουσιάζουν σημαντικές προσβολές μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική προστασία με μία μόνο εφαρμογή με ρυθμιστές μέχρι 20 Μαΐου, ή με κλασσικά και ιολογικά 24 - 26 Μαΐου.
 - Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

β. Φουζικλάδι : Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά μυκητοκτόνα ή με μίγματα τους με θεραπευτικά (τριαζόλες- βενζιμιδαζόλες) ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές.



ΛΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Καρπόκαψα : Όπου εμφανίζονται κάθε χρόνο προσβολές και μόνο όπου για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένη καρπόδεση συνιστάται η προστασία του καρπιδίου μέχρι 17-19 Μαΐου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ ή 19 – 21 Μαΐου με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, κ.α.

- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός μετά από 2 εβδομάδες.
- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός για τη σκωρίαση όπως στο δελτίο μας Νο 4 / 2 Μαρτίου 2011.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη