

№ 5 / 3 Μαρτίου 2011

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΙΑ

α. Κυκλοκόνιο. Η ασθένεια αυτή προσβάλλει κυρίως τα φύλλα της ελιάς και δημιουργεί σ' αυτά χαρακτηριστικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Όταν η προσβολή είναι έντονη **προκαλείται φυλλόπτωση**. Την περίοδο αυτή πάνω στις κηλίδες υπάρχουν άφθονα μολύσματα. Οι **βροχές, οι πρωινές δροσιές ειδικά σε μέρη υγρά, η πυκνή φύτευση, το ελλιπές κλάδεμα και οι ισχυρές λιπάνσεις**, ευνοούν την εξέλιξη της ασθένειας. Στα ελαιοκτήματα που υπάρχουν προσβολές συνιστάται ψεκασμός **όταν το μήκος της νέας βλάστησης θα είναι 2 - 5 εκατοστά**.

Κατάλληλα φάρμακα : 1) ΧΑΛΚΟΣ (βορδιγάλειος, θεϊκός, υδροξείδιο, υποξείδιο, οξυχλωριούχος).

Να σημειωθεί ότι ο βορδιγάλειος και ο οξυχλωριούχος χαλκός προκαλούν πτώση των προσβεβλημένων φύλλων. Ειδικότερα ο οξυχλωριούχος προκαλεί και πτώση υγιών φύλλων σε υγρές περιοχές. Η φυλλόπτωση των προσβεβλημένων φύλλων είναι επιθυμητή διότι λειτουργεί εξυγιαντικά (Μείωση μολυσμάτων).

Αν υπάρχει ταυτόχρονα και πρόβλημα λεκανίου συνιστάται να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση όπως περιγράφεται παρακάτω στο γ. (ΛΕΚΑΝΙΟ).

2) Οργανικά μυκητοκτόνα (ΝΤΟΝΤΙΝ, ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ)

β. Ακάρεια : Προκαλούν ζημιές σε φύλλα, άνθη και καρπούς σε πολλές περιοχές των Νομών Χαλκιδικής και Πιερίας. Όπου σημειώθηκαν ζημιές (και **μόνο** για τις επιτραπέζιες ελιές) συνιστάται ψεκασμός **όταν η ελιά βγάλει το δεύτερο ζευγάρι φύλλων της νέας βλάστησης**. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί στην έναρξη της άνθησης (κρόκιασμα).

Κατάλληλα φάρμακα : θερινό λάδι (Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα ειδικά ακαρεοκτόνα για την Ελιά)

γ. Λεκάνιο. Μόνο όπου παρατηρούνται προσβολές, συνιστάται να γίνει ψεκασμός από αρχές Απριλίου χρησιμοποιώντας θερινό λάδι 0,5-1 Lit./100 Kg νερό. Προσθέτοντας και 250 gr/100 Kg Νερό μεταλλικό χαλκό (0,5 Kg οξυχλωριούχο ή υδροξείδιο 50%) καταπολεμούμε και το κυκλοκόνιο. Ο παραπάνω ψεκασμός αντιμετωπίζει και τα ακάρεια της ελιάς. Ικανοποιητική καταπολέμηση του ΛΕΚΑΝΙΟΥ επιτυγχάνεται με τη χρήση του ρυθμιστή ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ αλλά η εφαρμογή του γίνεται αργότερα στα στάδια D και E (θα γίνει υπενθύμιση σε επόμενο δελτίο).

ΑΜΠΕΛΙ

α. Φύμωση. Τη χρονιά που πέρασε παρατηρήθηκαν προσβολές. Όπου παρουσιάζονται ζημιές συνιστώνται δύο εφαρμογές :

α) στο στάδιο D **και**

β) περίπου μετά από μία εβδομάδα στο στάδιο E

Κατάλληλα φάρμακα : ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΦΟΖΕΤΥΛ+ΦΟΛΠΕΤ, ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ ΜΑΝΕΜΠ, ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ+ΦΟΛΠΕΤ, ΜΕΤΙΡΑΜ, κ.α.

β. Ωίδιο. Είναι βασικής σημασίας η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις. Να γίνει επέμβαση στο στάδιο E με ΣΥΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ, ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ, ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ, ΦΟΛΠΕΤ+ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ, ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΑΦΙ κ.α.

γ. Ερίωση - Φυλλοκόπτης: Να γίνει εφαρμογή στο στάδιο E με θιόφι, σε συνδυασμό με το ωίδιο.



ΕΛΙΑ (Συμπτώματα κυκλοκόνιου)



ΑΜΠΕΛΙ



E

Οι επεμβάσεις που συνιστώνται σε κάθε στάδιο, να γίνονται όταν το 50% των ανθικών οργάνων φθάνουν στο στάδιο αυτό.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη