



Νο 7 / 29 Μαρτίου 2011

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ

1.Κόκκινος τετράνυχος. Όπου για διάφορους λόγους δεν έγιναν ψεκασμοί πριν την άνθηση και υπάρχει προσβολή συνιστάται να γίνει ψεκασμός, εναντίον των αυγών και των κινητών μορφών, όταν η μηλιά «ποικιλία Στάρκιγκ» βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο «**πλήρης πτώση πετάλων - έναρξη καρπόδεσης**» (H - I).

Κατάλληλα αγροχημικά: ΕΤΟΞΑΖΟΛ, ΧΕΞΥΘΙΑΖΟΧ, ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ, κ.α.



ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

1.Φουζικλάδι

- Εχουμε ήδη ώριμα ασκοσπόρια.
- Οι μηλιές είναι σε στάδιο ευαίσθητο σε προσβολές.
- Οι βροχοπτώσεις δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη μόλυνση.
- Συνιστάται η προστασία των δένδρων με προστατευτικά - θεραπευτικά μυκητοκτόνα (**ΟΧΙ** χαλκούχα), στο 70 - 90% της «πτώσης των πετάλων».

Κατάλληλα αγροχημικά: ΖΙΡΑΜ, ΘΙΡΑΜ, ΜΠΙΤΕΤΡΑΝΟΛ, ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ+ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΣΥΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ, ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ, ΚΑΠΤΑΝ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ+ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, κ.α.

2.Ωίδιο

Συνιστάται συνδυασμένη καταπολέμηση με το Φουζικλάδι, στο 75% της πτώσης των πετάλων με ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ, ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ+ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ, κ.α.

3.Καρπόκαψα

Σε περίπτωση που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε σύστημα παραμπόδισης συζεύξεων (Σκεύασμα ΕΧΟΕΧ CM), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει μέχρι 10-4-2011.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

1. Ωίδιο. Η καταπολέμηση αρχίζει κατά τα στάδια H - I, με βρέξιμο θειάφι, ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ, ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ, ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ, ΜΠΟΥΠΥΡΙΜΕΪΤ, κ.α.


2. Κλαδοσπόριο. Όπου την περυσινή χρονιά παρουσιάστηκαν προβλήματα, συνιστάται προστασία του καρπιδίου 2 εβδομάδες μετά την πτώση των πετάλων (στάδια H - I), σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του Ωιδίου με βρέξιμο θειάφι. Αν ακολουθήσει βροχερός καιρός και ειδικά στα κτήματα με βεβαρημένο ιστορικό, η επέμβαση να επαναληφθεί μετά από 15 ημέρες.

3. Μονίλια. Εφόσον επικρατήσει βροχερός καιρός, συνιστάται επέμβαση στην πτώση πετάλων. Αν χρησιμοποιηθεί στις παραπάνω επεμβάσεις (Ωίδιο, Κλαδοσπόριο) το βρέξιμο θειάφι, δεν απαιτείται χωριστή επέμβαση.



3. Ανάρσια – Καρπόκαψα Σε περίπτωση ιστορικού σοβαρών προσβολών, να γίνει ψεκασμός στην «απόσπαση του κάλυκα» - στάδιο Η.

Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ, κ.α.



ΚΕΡΑΣΙΑ

1. Μονύλια. Οπου επικράτησε βροχερός καιρός συνιστάται ψεκασμός στην «πτώση των πετάλων».

Κατάλληλα αγροχημικά : ΚΑΠΤΑΝ, ΠΡΟΧΛΟΡΑΖ, ΘΙΡΑΜ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΜΠΙΤΕΤΡΑΝΟΛ, κ.α.

2. Σκολύτης. Αναμένεται τέλη Απρίλη με αρχές Μαΐου η έξοδος των ενηλίκων από τα κλαδιά των δένδρων. Σε κερασεώνες με προσβολές από το μικρό αυτό σκαθάρι συνιστάται να γίνει κάψιμο των ξερών προσβεβλημένων κλαδιών (υπόλοιπα του κλαδέματος ή εντομοπαγίδες) μέχρι 20-25 Απριλίου.

3. ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ (Gnomonia erythrostoma) – Ατελής μορφή το *Cylindrosporium pruni-cerasi*)



Στα δένδρα που παρουσιάζουν προσβολή τα προσβεβλημένα φύλλα παρουσιάζουν διάσπαρτες, μικρές, πολυάριθμες υποκίτρινες ή υπέρυθρες κηλίδες που αργότερα γίνονται καστανές. Τα φύλλα αυτά προοδευτικά κάμπτονται προς τα κάτω, ξηραίνονται και παραμένουν στο δέντρο και το χειμώνα.

Σε περίπτωση που είχαμε την προηγούμενη χρονιά προσβολή (άρα υπάρχουν ξερά φύλλα στα δένδρα το χειμώνα), συνιστάται επέμβαση στο στάδιο I (απόσπαση του κάλυκα) με ΝΤΟΤΙΝ.

4. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ *Cylindrosporium padi*

Στα προσβεβλημένα φύλλα παρουσιάζονται μικρές καστανοκόκκινες κηλίδες που συνενώνονται και καταλαμβάνουν όλο το έλασμα, το οποίο προσλαμβάνει καστανοκόκκινη χροιά. Τα έντονα προσβεβλημένα φύλλα ξηραίνονται, γίνονται εύθραυστα, κάμπτονται προς τα πάνω και πέφτουν πρόωρα.

Σε περίπτωση που είχαμε προσβολή τη χρονιά που πέρασε, συνιστάται συνδυασμένη καταπολέμηση με την Ανθράκνωση, όπως παραπάνω.



**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη