

**No 1 / 28 Ιανουαρίου 2011**


Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

**ΕΧΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΚΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ  
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

### ΑΧΛΑΔΙΑ

#### **A. ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ**

- ✚ Στους αχλαδέωνες της περιοχής μας παρατηρήθηκαν πληθυσμοί ψύλλας και θηλυκά με αυγά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
- ✚ Στις 25 Ιανουαρίου παρατηρήθηκε η αρχή σποραδικών ωτοκίων.
- ✚ Γενίκευση των ωτοκίων αναμένεται περίπου στις 15 - 20 Φεβρουαρίου.
- ✚ Σε κτήματα που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει ψεκασμός από τη λήψη του Δελτίου και μέχρι 12 Φεβρουαρίου, σε μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 10°C υπό σκιά και χωρίς άνεμο, με συνθετικές πυρεθρίνες μαζί με λάδι. Ο ψεκασμός αυτός στρέφεται κατά των τελείων εντόμων και κατά των αυγών.
- ✚ Τα λάδια λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωτοκίας, επειδή η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά σε επιφάνειες που έχουν λάδι.
- ✚ Τα χειμερινά λάδια εφαρμόζονται έως την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών (στάδιο «B»).
- ✚ Τα θερινά λάδια εφαρμόζονται μέχρι το στάδιο «E2».
- ✚ Σαν αποτρεπτικό ωτοκίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο καολίνης.



Ακμαίο *Psylla pyri*

Ωό

#### **B. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ.**

**ΜΕΤΡΑ.** Σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές:

- Να εκριζωθούν και να καούν τα βαριά προσβεβλημένα δένδρα.
- Να αφαιρεθούν από τα ελαφρά προσβεβλημένα δένδρα όλα τα τμήματα με προσβολή με ξηρό καιρό και να καούν.
- Να αφαιρεθούν οι λαίμαργοι και τα παραβλαστήματα.
- Σε όλες τις περιπτώσεις να απολυμαίνονται οι τομές.
- Να καταστραφούν οι ξενιστές σε απόσταση 800μ.
- Να περπατάτε το κτήμα μετά την άνθηση και μέχρι αρχές του καλοκαιριού και να αφαιρείτε τα προσβεβλημένα νέα βλαστώρια.
- Η περιποίηση των προσβεβλημένων δένδρων αφήνεται στο τέλος. Μετά από κάθε δένδρο τα εργαλεία κοπής πρέπει να απολυμαίνονται με εμβάπτιση σε διάλυμα 10% υποχλωριώδους νατρίου (σπιτική χλωρίνη) ή υδατικό διάλυμα φορμόλης του εμπορίου 5%.
- Ενδείκνυται στο τέλος της ημέρας τα εργαλεία να πλένονται και να λαδώνονται, για την αποφυγή οξειδώσεων.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.**

1. Πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (διάστημα από στάδιο «Α» μέχρι αρχή σταδίου «B») συνιστάται ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα στις υψηλότερες δόσεις.
2. Από το στάδιο της «πράσινης κορυφής» μπορεί να εφαρμοσθεί και το ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ (προληπτικοί ψεκασμοί μέχρι και την πτώση των πετάλων, με επανάληψη κάθε 10 ημέρες).



## ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ







### 1. ΕΞΩΑΣΚΟΣ- ΚΟΡΥΝΕΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Απαραίτητη εφαρμογή)

Να γίνει ψεκασμός λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (φάση Α ως και Β).

Επισημαίνουμε ότι το ευαίσθητο στον ΕΞΩΑΣΚΟ στάδιο των βλαστοφόρων οφθαλμών αρχίζει όταν ο οφθαλμός φθάσει στο στάδιο «Β» (ανοίγουν ελαφρά τα λέπια και φαίνεται από πάνω η πράσινη κορυφή).

**Κατάλληλα Αgroχημικά:** Χαλκούχα, ΚΑΠΤΑΝ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΘΙΡΑΜ, ΖΙΡΑΜ,

Ο ψεκασμός να γίνει πριν φανεί πράσινη βλάστηση.

	ΣΤΑΔΙΟ Α (Νωρίς)	ΣΤΑΔΙΟ Β (Επίκαιρο)	ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΥΛΛΟΥ (Στάδιο C) (Πολύ αργά)
Πλάγης οφθαλμός			
Κορυφαίος οφθαλμός της πλάγης βλάστησης			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	<p>Τα λέπια ανοίγουν ελαφρά &amp; βλέποντας από πάνω διακρίνουμε πράσινη ή κόκκινη κορυφή του πρώτου φύλλου</p>		
	<p>Το πρώτο φύλλο προβάλλει ανάμεσα στα λέπια και φαίνεται από πλάγια</p>		

- Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής προωρίτητας, ο πρώτος ψεκασμός να γίνει κοντά στο στάδιο «Β» της προωρίτερης ποικιλίας και να επαναληφθεί μετά από 10 -12 ημέρες.
- Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί όταν ο ψυχρός και υγρός καιρός παρατείνει τη διάρκεια της διόγκωσης των οφθαλμών.

### 2. ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ (Απαραίτητη εφαρμογή)

Ψ Η Μονιλία προσβάλλει τα άνθη όλων των πυρηνοκάρπων.

Ψ Τα ευαίσθητα τμήματα της βερικοκιάς είναι «Σέπαλα – Πέταλα – Ανθήρες – Στίγμα».

Ψ Η πρώτη και απαραίτητη εφαρμογή είναι στο «Κόκκινο μπουμπούκι – Στάδιο C».

Ψ **Κατάλληλα αγροχημικά:** - Χαλκούχα, ΜΠΙΤΕΡΤΑΝΟΛ, ΚΑΠΤΑΝ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΘΙΡΑΜ, ΠΡΟΠΙΚΟΝΑΖΟΛ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αγροχημικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση τους περιορισμούς που έχουν στις διάφορες καλλιέργειες.

### 3. ΚΟΡΥΝΕΟ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

Μόνο σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές κάθε χρόνο και όταν επικρατεί βροχερός καιρός, να γίνει εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.

**Κατάλληλα αγροχημικά:** Χαλκούχα, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΘΙΡΑΜ



**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϋσταμένη Δ/σης  
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη