



Νο 16 / 9 Ιουνίου 2011

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΕΛΙΑ (Ισχύει για τους Νομούς Θεσ/νίκης-Χαλκιδικής)

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

- α. Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) μπαίνει στο βλαστικό στάδιο Ι (μέγεθος καρπού περίπου 3 χιλιοστά) που είναι ευαίσθητο για προσβολές από πυρηνοτρήτη.
- β. Η πτήση του εντόμου άρχισε σ' όλες τις περιοχές.
- γ. Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου).
- δ. Οι πρώτες εκκολάψεις αναμένονται στις 18 - 20 Ιουνίου.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ : Να γίνει ψεκασμός σε ελαιοκτήματα ή περιοχές με αυξημένη συνήθως σχετική υγρασία και στα οποία για συνεχή χρόνια παρατηρούνται ζημιές από το έντομο.

Ημερομηνίες ψεκασμού :

α) στις **πρώιμες** παραθαλάσιες περιοχές (Κασσάνδρα, Σιθωνία):

* Μέχρι 18 Ιουνίου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ ή



* 18 - 20 Ιουνίου με κλασσικά (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ, ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ) στις δόσεις που συνιστούν οι παρασκευαστές τους), εφόσον το 50% των καρπών έχει μέγεθος περίπου 3-5 χιλιοστά (μέγεθος κόκκου σίτου, Στάδιο Ι), διότι ο πυρηνοτρήτης δεν ωριμάζει σε ελιές μικρότερες από 3 χιλιοστά.

β) στις **μεσοπρώιμες** και **όψιμες** περιοχές:

* Μέχρι 20 Ιουνίου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ ή

* 21 - 22 Ιουνίου με κλασσικά (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ, ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ) στις δόσεις που συνιστούν οι παρασκευαστές τους), και εφόσον το 50% των καρπών θα έχει μέγεθος περίπου 5-8 χιλιοστά (στάδιο Ι₁).

Σημ.: Ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 12 - 18 ημέρες, ανάλογα με το αγροχημικό που έχει χρησιμοποιηθεί.



**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη