



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpet1@otenet.gr

No 22 / 5 Ιουλίου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

A. ΣΑΝ ΖΟΖΕ (Μηλοειδή – Πυρηνόκαρπα).

Αναμένεται η έξοδος των ερπουσών της δεύτερης γενιάς.

- Δεν συνιστάται γενική καταπολέμηση.

- Μόνο σε κτήματα που απέτυχαν ή δεν έγιναν οι προηγούμενες εφαρμογές και παρουσιάζουν προσβολές, συνιστάται:

I. ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

α. Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός 18 - 20 Ιουλίου και επανάληψη μετά από 12 - 14 ημέρες.

β. Σε μέτριες προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή 24 - 26 Ιουλίου.

- Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, κ.ά.

II. ΟΨΙΜΕΣ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

α. Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός 27 - 29 Ιουλίου και επανάληψη μετά από 12 - 14 ημέρες.

β. Σε μέτριες προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή 2 - 4 Αυγούστου.

- Κατάλληλα αγροχημικά: Όπως παραπάνω στις πεδινές περιοχές.

B. ΝΑΡΚΕΣ (Μηλιά - Αχλαδιά)

Ξεκίνησε η τρίτη πτήση του εντόμου αρχές Ιουλίου.

♦ Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή.

♦ Να γίνει καταπολέμηση σε συνδυασμό με το ΣΑΝ ΖΟΖΕ (όπως αναφέρεται παραπάνω) ή με το ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ (ΠΕΛΙΝΑ: 1^η εφαρμογή, Δελτίο Νο20/21-6-12 & ΟΡΕΙΝΑ: επαναληπτικός ψεκασμός, Δελτίο Νο21/29-6-12).

♦ **ΜΟΝΟ** αν δε γίνουν οι παραπάνω επεμβάσεις και παρουσιάζεται σοβαρή προσβολή, να γίνει καταπολέμηση με ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, κ.α...:

α. Στις πεδινές - πρώιμες περιοχές 16 - 18 Ιουλίου.

β. Στις όψιμες - ορεινές περιοχές 25 - 27 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη