



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpet1@otenet.gr

No 18 / 8 Ιουνίου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΠΕΛΙΝΕΣ – ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ

Α. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Προσβάλλει επίσης *ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ*)

- Αρχισε η 2^η πτήση του εντόμου.
- Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται περίπου στις 18 - 19 Ιουνίου
- Συνιστάται σε κτήματα που παρουσιάζουν κάθε χρόνο σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός:
 - Από **11-12 Ιουνίου** με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ ή ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ **ή**
 - Από **13 -17 Ιουνίου** με ρυθμιστές (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΛΟΥΦΕΝΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) **ή**
 - Στις **16 -17 Ιουνίου** με ΙΟΛΟΓΙΚΟ εντομοκτόνο CrGV
 - Από **18-20 Ιουνίου** με κλασσικά εντομοκτόνα όπως ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ ΜΠΕΝΖΟΑΤΕ (Σκεύασμα AFFIRM), κ.α.
 - Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά 2- 3 βδομάδες, *ανάλογα με το αγροχημικό.*
- **ΣΗΜ. 1:** Σε κτήματα με ελαφρές προσβολές συστήνεται να γίνει μόνο μία εφαρμογή με ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ στις 21-22 Ιουνίου ή με ΚΛΑΣΣΙΚΑ - ΙΟΛΟΓΙΚΑ στις 23-24 Ιουνίου.

Β. ΝΑΡΚΗ (Μηλιά)

Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή. Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

Γ. ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ (Κόσσοι- Ζευζέρα- Καπνώδης).

Να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπισή τους με ψεκασμούς το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

- ♦ Για τον κόσσο και τον καπνώδη ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.
- ♦ Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ (Διάφορα σκευάσματα), κ.ά.

Συνιστάται η συνδυασμένη καταπολέμηση με την Καρπόκαψα με επιλογή κατάλληλου αγροχημικού.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ. (Προσβάλλει και την ακτινιδιά)

Αναμένεται η εμφάνιση των νεαρών προνυμφών της β' γενεάς. Μόνο σε κτήματα που απέτυχαν ή δεν έγιναν εφαρμογές κατά τους μήνες Απρίλιο - Μάιο και παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.

Α. Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός 21 - 23 Ιουνίου και επανάληψη μετά από 12 - 14 ημέρες.

Β. Σε ελαφρές προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή 28-30 Ιουνίου

Γ. Κατάλληλα αγροχημικά: ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ.

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ (Gnomonia erythrostoma) - **ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ** (Cylindrosporium padi).

Σε κτήματα που εμφανίζονται προσβολές (κηλίδωση των φύλλων) να εφαρμοσθεί μετά τη συγκομιδή ψεκασμός με NTONTIN.

ΣΗΜ.1.: Τα προσβεβλημένα φύλλα από ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ παραμένουν στο δένδρο και μετά τη φυλλόπτωση του φθινοπώρου, ενώ αντίθετα τα προσβεβλημένα φύλλα από ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ πέφτουν πρόωρα.

ΣΗΜ.2.: Περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο Νο7/2-4-12

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη