



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpet1@otenet.gr

No 12 / 30 Απριλίου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΟΡΕΙΝΕΣ – ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

α. Καρπόκαψα.


Να γίνει ψεκασμός :

- Από 2 έως 7 Μαΐου με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ ή
- Από 3 έως 13 Μαΐου με ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ (σκεύασμα CORAGEN) ή
- Από την παραλαβή του δελτίου μέχρι 13 Μαΐου με ρυθμιστές (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) ή
- Από 14 - 16 Μαΐου με κλασσικά εντομοκτόνα όπως ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, κ.α.

Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά 2- 3 βδομάδες, ανάλογα με το αγροχημικό.

- Οι ρυθμιστές να προτιμηθούν αν είχαμε ζημιές και από νάρκες.
- Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 14 - 16 Μαΐου ιολογικά εντομοκτόνα CrGV, τα οποία είναι ιδιαίτερα συμβατά με την ολοκληρωμένη διαχείριση (3 εφαρμογές ανά δεκαήμερο).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J).
- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
 - Σε κτήματα που δεν παρουσιάζουν σημαντικές προσβολές μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική προστασία με μία μόνο εφαρμογή με ρυθμιστές μέχρι 14 Μαΐου, ή με κλασσικά και ιολογικά 20 - 22 Μαΐου.
 - Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

β. Φουζικλάδι : Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά μυκητοκτόνα ή με μίγματα τους με θεραπευτικά (τριαζόλες- βενζιμιδαζόλες) ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές.



ΛΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Καρπόκαψα: Όπου εμφανίζονται κάθε χρόνο προσβολές και μόνο όπου για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένη καρπόδεση συνιστάται η προστασία του καρπιδίου **μέχρι 11 Μαΐου** με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΙΕΝΖΟΥΡΟΝ ή **12 – 15 Μαΐου** με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, κ.α.

- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός μετά από 2 εβδομάδες.
- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός για τη σκωρίαση.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη