



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpel1@otenet.gr

№ 24 / 20 Ιουλίου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΠΕΛΙΝΕΣ – ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Α. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Ξεκίνησε η τρίτη πτήση. Διαπιστώθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την πραγματοποίηση των συζεύξεων και αναμένεται η έναρξη των ωοτοκιών στις 21-22 Ιουλίου. Οι εκκολάψεις αναμένονται στις 27 -28 Ιουλίου.

Συνιστάται η προστασία των καρπών:

α. Αν χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές ανάπτυξης, ο ψεκασμός να γίνει μέχρι 26 Ιουλίου.

β. Αν προτιμηθούν τα κλασσικά ή ιολογικά εντομοκτόνα, να γίνει ψεκασμός από 27 - 29 Ιουλίου.

Κατάλληλα αγροχημικά:

I. Ρυθμιστές Ανάπτυξης: ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΤΕΜΠΙΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ,
ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΙΕΝΖΟΥΡΟΝ & ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ

II. Κλασσικά Εντομοκτόνα: ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ,
ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ (σκεύασμα AFFIRM), Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, κ.α.

III. Ιολογικά Εντομοκτόνα: CpGV.

Επανάληψη του ψεκασμού απαιτείται μετά από 12-18 ημέρες ανάλογα με το αγροχημικό που χρησιμοποιήθηκε και **μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε υψηλούς πληθυσμούς** (ένδειξη παγίδας ή υψηλές προσβολές από την προηγούμενη γενεά).

Β. ΝΑΡΚΕΣ

Αν γίνει καταπολέμηση για την καρπόκαψα, δεν απαιτείται ειδική επέμβαση.

Γ. ΞΥΛΟΦΑΓΑ (Κόσσοι, Σέζια, Ζευζέρα)

Οπου σημειώνονται προσβολές να γίνει επανάληψη της εφαρμογής, που συστήθηκε με το Δελτίο Νο18/8-6-2012, με την παραλαβή του δελτίου, όπως παρακάτω:

A. Για τον ΚΟΣΣΟ, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.

B. Για τη ΣΕΖΙΑ, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες.

Γ. Για τη ΖΕΥΖΕΡΑ, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

Αν στην παραπάνω εφαρμογή ληφθεί μέριμνα διαβροχής και του εδάφους γύρω από το λαιμό σε ακτίνα 50-60 εκ., με ποσότητα περίπου 10 λίτρων υγρού ανά δένδρο καταπολεμούνται και οι προνύμφες της ΜΗΛΟΛΟΝΘΗΣ (Anoxia orientalis) και του ΚΑΠΝΩΔΗ.

Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ.

Δ. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Συνιστάται η προστασία των καρπών σε χρόνους ίδιους με αυτούς της καρπόκαψας της μηλιάς, με κατάλληλα αγροχημικά .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη