



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpe11@otenet.gr

№ 25 / 1 Αυγούστου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΝΟΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

Ξεκίνησε η τρίτη πτήση του εντόμου. Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται 9 - 10 Αυγούστου.

Επειδή η γενιά αυτή είναι η πλέον ζημιογόνος και τα όρια ανεκτής ζημιάς πολύ χαμηλά, **να γίνει ψεκασμός:**

α. Από 4 έως 10 Αυγούστου με ρυθμιστές ανάπτυξης (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ)

ή

β. Από 11 έως 13 Αυγούστου με κλασσικά εντομοκτόνα: ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ -ΜΕΘΥΛ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ ΜΠΙΕΝΖΟΑΤΕ (Affirm), ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΙΠΓΚΙΑΣ (με την προσθήκη 3 % ζάχαρης).

- Ο Βάκιλλος Θουριγκίας να προτιμηθεί για εφαρμογή κοντά στη συγκομιδή. Σε σταφύλια με πυκνό βότρυ να προτιμηθεί η σκόνη επίπασης.
- Αν προτιμηθούν κλασσικά εντομοκτόνα ή Βάκιλλος Θουριγκίας, ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά από 12 - 14 ημέρες. Αν εφαρμοσθεί ρυθμιστής, η επανάληψη να γίνει σε 16 - 18 ημέρες.
- Ο ψεκασμός αυτός να κατευθύνεται μόνο στα σταφύλια.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** στα όρια τελευταίας εφαρμογής πριν τη συγκομιδή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη