

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 43 / 23 Αυγούστου 2017

ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ
(*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)

- Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων της Ημαθίας και της Πιερίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 4^η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 17-20 Αυγούστου.
- Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας και της Νάουσας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.
- Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 21-23 Αυγούστου.
- Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 26-28 Αυγούστου.

- Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
 - **24-26 Αυγούστου** για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
 - **28-30 Αυγούστου** για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

- **Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.**
- Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και τότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.
- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
(*Cydia funebrana* Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

- Η 3^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Συνιστάται επέμβαση στις ημερομηνίες που προτείνονται για την καρπόκαψα της μηλιάς.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

(*Ceratitis capitata* Wiedemann, Diptera: Tephritidae)

- Στο δίκτυο παγίδων της υπηρεσίας μας παρατηρήθηκαν συλλήψεις του εντόμου στην περιοχή της Ημαθίας.
- Είναι πολυφάγο είδος. Προσβάλλει την ροδακινιά, αχλαδιά, δαμασκηνιά, συκιά, λωτούς, μηλιά, κυδωνιά, κ.α.
- Το έντομο προσβάλλει τους καρπούς **από την αλλαγή του χρώματος** και έως την συγκομιδή. Μπορεί να πετάξει σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων για να βρει κατάλληλο καρπό για ωοτοκία.
- Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης του εντόμου. Η μαζική παγίδευση, οι δολωματικοί ψεκασμοί και οι ψεκασμοί καλύψεως.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ - ΑΝΑΡΣΙΑ - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm,

Lepidoptera: Gelechiidae,


Anarsia lineatella Zeller, **Lepidoptera:**

Gelechiidae,

Grapholitha molesta Busck, **Lepidoptera:**

Tortricidae)


- Η πτήση και των τριών εντόμων συνεχίζεται με χαμηλές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Δεν συνιστάται γενική καταπολέμηση.
- Σε οπωρώνες με σοβαρό ιστορικό ή που παρατηρούνται προσβολές, συνιστάται επέμβαση με σκευάσματα του **Bacillus thuringiensis**.



ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae)

- Η 2^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Προσβάλλει και την ακτινιδιά.
- **Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση.** Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σοβαρές προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.



Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης